



Półgrube litery (\mathbf{a} , \mathbf{b} , ...) oznaczają wektory swobodne.

1. Wektor $\vec{a} = [3, 4, 5]$ ma początek w punkcie $M(-2, 2, 5)$. Znaleźć współrzędne jego końca.
2. Niech $\mathbf{a} = [1, 2, 3]$, $\mathbf{b} = [1, -2, 5]$. Oblicz
 - (a) $3(\mathbf{a} + \mathbf{b})$,
 - (b) Iloczyn skalarny $\mathbf{a} \circ \mathbf{b}$,
 - (c) Długości wektorów \mathbf{a} , \mathbf{b} ,
 - (d) Kąt pomiędzy wektorami \mathbf{a} , \mathbf{b} .
3. Oblicz iloczyn skalarny $\mathbf{a} \circ \mathbf{b}$, wiedząc, że $\|\mathbf{a}\| = \frac{1}{4}$, $\|\mathbf{b}\| = \frac{4}{5}$ oraz że sinus kąta pomiędzy tymi wektorami wynosi $\frac{3}{5}$, sam zaś kąt należy do przedziału $(\frac{\pi}{2}, \pi)$.
4. Wiedząc, że $\|\mathbf{a}\| = 2$, $\|\mathbf{b}\| = 3$ oraz $\mathbf{a} \circ \mathbf{b} = -4$, oblicz $(\mathbf{a} + 2\mathbf{b}) \circ (\mathbf{b} - 3\mathbf{a})$.
5. Wykaż, że kąt wpisany w okrąg i oparty na średnicy jest kątem prostym. (Wskazówka: punkty leżące na okręgu o środku w środku układu współrzędnych i o promieniu r spełniają równanie $x^2 + y^2 = r^2$.)
6. Platforma o szerokości d porusza się z prędkością \vec{v}_1 pomiędzy dwoma równoległymi peronami (wzdłuż peronów). W punkcie O na platformę wbiega człowiek, który porusza się z prędkością \vec{v}_2 względem platformy, prostopadle do jej kierunku ruchu. W jakiej odległości od punktu A, leżącego na przeciw punktu O na drugim peronie, człowiek zejdzie z platformy?
7. Linia prosta porusza się z prędkością \vec{v} w kierunku prostopadłym do siebie i przecina pod kątem α drugą prostą, nieruchomą względem niej. Znaleźć prędkość, z jaką porusza się punkt przecięcia.
8. Dane są wektory $\mathbf{a} = [3, x, y]$, $\mathbf{b} = [1, 2, 3]$, $\mathbf{c} = [2, -4, -1]$.
 - (a) Znajdź kąt pomiędzy wektorami \mathbf{b} , \mathbf{c} .
 - (b) Znajdź wartości zmiennych x , y , dla których wektor \mathbf{a} jest prostopadły do wektorów \mathbf{b} , \mathbf{c} .
 - (c) Znajdź wektor \mathbf{c}' prostopadły do wektora \mathbf{b} i do wektora \mathbf{a} obliczonego w poprzednim zadaniu. Jaki jest związek pomiędzy wektorem \mathbf{c}' a wektorami \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} ?
9. Znajdź rzut wektora $[1, -2]$ na prostą $y = 3x + 1$.
10. Znajdź równanie prostej prostopadłej do prostej $y = -2x + 4$ i przechodzącej przez punkt $(1, 1)$.
11. Znajdź długość przekątnej głównej sześcianu.
12. Oblicz kąt pomiędzy dwiema przekątnymi ścian bocznych sześcianu wychodzącymi z jednego wierzchołka.
13. Oblicz kąt pomiędzy przekątną główną sześcianu a
 - (a) krawędzią sześcianu wychodzącą z tego samego wierzchołka,
 - (b) przekątną ściany bocznej sześcianu wychodzącą z tego samego wierzchołka.
14. Niech $\mathbf{x} = [\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0]$, $\mathbf{y} = [\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0, \frac{1}{\sqrt{3}}]$.
 - (a) Oblicz długości wektorów \mathbf{x} , \mathbf{y} .
 - (b) Znajdź kąt, jaki tworzą te dwa wektory.
 - (c) Znajdź dwa wzajemnie prostopadłe wektory jednostkowe \mathbf{z} , \mathbf{s} , jednocześnie prostopadłe do wektorów \mathbf{x} , \mathbf{y} . Czy to zadanie ma jednoznaczne rozwiązanie?

Uwaga: \mathbf{x} , \mathbf{y} , \mathbf{z} , $\mathbf{s} \in \mathbb{R}^4$.